

# Soyez prêt à intervenir dans le cas D'HYPOGLYCÉMIE

L'une des complications les plus dangereuses observées chez les animaux de compagnie diabétiques traités par insulinothérapie est l'hypoglycémie, c'est-à-dire un taux de sucre dans le sang inférieur à la normale. Voici des situations dans lesquelles l'hypoglycémie pourrait se produire :

- Votre animal de compagnie a reçu sa dose habituelle d'insuline, mais il n'a pas mangé sa ration normale de nourriture.
- Votre animal de compagnie est anormalement actif, entraînant une consommation significativement plus élevée d'énergie (glucose).
- Votre animal de compagnie a reçu trop d'insuline par rapport à ses besoins actuels.

Si le taux de glycémie de votre animal de compagnie est trop bas, son cerveau reçoit un apport insuffisant de glucose, ce qui peut être mortel. Il est donc important de savoir quoi faire.

## Surveillez ces signes importants :

- Tranquillité ou somnolence inhabituelles
- Faim
- Agitation
- Tremblements ou frissons
- Mouvements ou comportements inhabituels
- Nervosité
- Perte de conscience (coma)

## Conservez ce feuillet dans un endroit accessible

Cette communication est fournie aux médecins vétérinaires en guide de matériel éducatif pour les propriétaires d'animaux diabétiques traités au Caninsulin®.



## EN CAS D'HYPOGLYCÉMIE restez calme et suivez les étapes suivantes :

- 1 Donnez immédiatement de la nourriture à votre animal de compagnie.
- 2 Si votre animal de compagnie refuse de manger ou en est incapable, administrez-lui du glucose aussi rapidement que possible. Gardez toujours une source de glucose à portée de la main (par exemple, du sirop de maïs ou de la poudre de glucose mélangée avec de l'eau). Donnez un gramme de glucose par kilogramme de poids corporel. Administrez la solution en prenant toutes les précautions qui s'imposent. Si votre animal de compagnie est inconscient ou incapable d'avaler, frottez la solution de glucose sur les gencives et, plus particulièrement, sur la région sous la langue. Attention à vos doigts pour éviter toute morsure accidentelle.
- 3 Dès que votre animal de compagnie semble se rétablir, donnez-lui une petite quantité de sa nourriture habituelle. Surveillez de près votre animal de compagnie pendant plusieurs heures pour vous assurer qu'aucun signe ne réapparaisse et donnez-lui régulièrement de petites quantités de nourriture.
- 4 Si l'état de votre animal de compagnie s'aggrave ou en cas de doute, appelez immédiatement votre vétérinaire ou un centre d'urgence vétérinaire ouvert 24 heures.

**VÉTÉRINAIRE OU HÔPITAL OUVERT 24 H EN CAS D'URGENCE:**

