



Faites-en sorte que les veaux  
soient d'attaque dès le départ

## Aider à enrichir le colostrum avec **BOVILIS® Guardian®** : la première ligne de défense des veaux contre la diarrhée néonatale

Contribuez à garantir que le colostrum que reçoivent les veaux contient une concentration élevée des bons anticorps en vaccinant les vaches gestantes avec **BOVILIS® Guardian®**.

- **Couverture à large spectre** contre les virus et les bactéries responsables de la diarrhée les plus prévalents et pertinents.
  - Renferme un extrait acellulaire de souches d'*Escherichia coli* portant le pilus K99, une combinaison unique de deux coronavirus inactivés, deux rotavirus de type G inactivés et une bactérine-anatoxine de *Clostridium perfringens* de types C et D.
- **Indiqué pour aider:**
  - à prévenir la diarrhée néonatale du veau causée par des **rotavirus bovins du Groupe A de sérotype G6**;
  - à prévenir la diarrhée néonatale du veau causée par des souches entérotoxigènes de ***E. coli* du type K99**;
  - à prévenir l'entérotoxémie causée par des souches de ***C. perfringens* de types C et D**.
  - à contrôler la diarrhée néonatale du veau causée par les **coronavirus bovins**.
- **Vaccination au moment opportun pour une concentration en anticorps optimale du colostrum†.**

### Le SEUL vaccin SOUS-CUTANÉ contre la diarrhée néonatale pour les vaches et les taures gestantes qui offre :

- la technologie des sous-unités s'appuyant sur les pili plutôt que sur la cellule entière ou la paroi cellulaire d'*E. coli* (une source potentielle d'endotoxines) pour provoquer une **forte réponse immunitaire contre les pili d'*E. coli* K99 et causer moins de réactions au point d'injection**;
- une protection contre le **coronavirus de type 3**;
- une protection contre ***C. perfringens* de type D** qui, lorsqu'associé à *C. perfringens* de type C, **procure une protection croisée contre le type B**.



Pour en savoir plus sur **BOVILIS® Guardian®** ou pour obtenir du soutien technique, communiquez avec votre représentant de Merck Santé animale au 1-866-683-7838 ou visitez le site [www.merck-sante-animale.ca](http://www.merck-sante-animale.ca).

†Injecter à la femelle gravide en santé 3 mois avant le vêlage. Répéter l'administration de 3 à 6 semaines après la vaccination initiale. Pour les vêlages subséquents, revacciner de 5 à 7 semaines avant le vêlage. Toujours lire l'étiquette et suivre le mode d'emploi afin de vous assurer que ce produit convient à l'animal à vacciner.